




НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОМУ ВИРУСУ

за 40 неделю 2025 года. (29.09.25 - 05.10.25)

На 40 неделе 2025 года ситуация по респираторно-синцициальному вирусу (РС) в России оставалась стабильной. По данным из 37 городов (Архангельск, Астрахань, Белгород, Биробиджан, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Москва ФГУЗ, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск, Санкт-Петербург НИИ Гриппа, Симферополь, Смоленск, Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск), расположенных в 7 Федеральных округах, методом ПЦР на РС-вирусную инфекцию обследовано 6758 больных, выявлено 9 (**0,1%**) случаев РС-вирусной инфекции, в том числе 4 (0,4%) случая у детей в возрасте 0-2 года, 4 (0,6%) случая у дошкольника в возрасте 3-6 лет и 1 (0,03%) случай у больного возрастной группы 15 лет и старше.


Рис.1. Мониторинг РС-вирусной инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России



Мониторинг результатов ПЦР-диагностики РС-вирусной инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что, в целом, с 40 недели 2025 года, обследовано 6758 больных, в том числе 997 детей в возрасте 0-2 года, 689 дошкольников 3-6 лет, 1363 школьника 7-14 лет и 3709 взрослых больных в возрасте 15 лет и старше. РС-вирус, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастной группе детей 3-6 лет.

Суммарная частота диагностирования у детей в возрасте 0-2 года составила **0,4%** от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет РС-вирус был выявлен в **0,6%** случаев, у школьников 7-14 лет – в **0,0%**. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше РС-вирус был диагностирован у **0,03%** больных.

Рис. 2. Суммарная частота диагностирования РС-вирусной инфекции в отдельных возрастных группах больных за период с 40 недели 2025 года по 40 неделю 2025 года



В среднем частота диагностирования РС-вируса составила **0,1%**.