



НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ГРИППУ И ОРВИ

за 46 неделю 2025 года. (10.11.25 - 16.11.25)

Ситуация в России

Резюме

На 46 неделе 2025 года уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ повысился, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 54,0 на 10 000 населения, был ниже базовой линии (82,9) на 34,9% и ниже еженедельного эпидемического порога на 19,8%.

На 46 неделе 2025 года эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению не были превышены на 20% и более ни в одном из 61 города, приславшего данные.

Лабораторными методами на 46 неделе 2025 года при исследовании материалов от 10084 больных гриппом в 46 городах зарегистрировано 683 (6,8%) случая гриппа, в том числе 290 (2,9%) случаев несубтипированного гриппа А в 10 городах, 13 (0,1%) случаев гриппа А(Н1N1)pdm09 в 2 городах, 374 (3,7%) случая гриппа А(Н3N2) в 29 городах и 6 (0,06%) случаев гриппа В в 6 городах.

На 46 неделе на клеточной культуре МДСК выделено 3 вируса гриппа А(Н3N2), том числе: в Москве (ЦЭЭГ) (1), Москве (ФГУЗ) (1) и Новосибирске (1). Всего с начала сезона 2025-2026 в опорных базах и НЦГ было изолировано 6 вирусов гриппа А(Н3N2).

Антигенная характеристика. В НЦГ Москвы (ЦЭЭГ) и Санкт-Петербурга (НИИ гриппа) антигенно охарактеризовано 7 вирусов гриппа, в том числе: 1 вирус гриппа А(Н1N1)pdm09 и 6 вирусов гриппа А(Н3N2). Вирус А(Н1N1)pdm09 был родствен референс штамму A/Victoria/4897/22, рекомендованному в состав вакцин для стран Северного полушария на сезон 2025-2026 гг. 5 вирусов А(Н3N2) были дрейф-вариантом референс штамма A/Croatia/10136RV/23, также рекомендованному в состав вакцин для стран Северного полушария на сезон 2025-2026 гг., 1 вирус А(Н3N2) был подобен референс штамму A/Thailand/8/2022.

COVID-19. Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 с 12 недели. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Согласно поступившей информации в базу данных НИИ гриппа на 46 неделе, в системе надзора за гриппом и ОРВИ, по результатам ПЦР анализа клинических материалов от 13506 больных, новый коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен в 323 (2,4%) случаях.

ОРВИ. Частота диагностирования ОРВИ негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцициальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция) составила по результатам ПЦР 15,3%, по результатам ИФА (парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцициальная инфекция) 17,8%.

В системе Сигнального надзора на прошедшей неделе на грипп обследовано 19 больных ТОРИ в 3 городах (Калининград, Новосибирск, Чита), случаев гриппа не выявлено.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 17 больных ТОРИ в 2 городах, выявлено 4 (26,7%) случая новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в Чите у ребёнка возрастной группы 1-4 года (1) и у больных возрастной группы 65 лет и старше (3).

На вирусы ОРВИ обследовано 17 больных ТОРИ, зарегистрировано 5 (29,4%) случаев ОРВИ, в том числе: 1 случай аденовирусной и 4 - риновирусной инфекции.


При обследовании 46 амбулаторных больных ГПЗ/ОРИ случаев гриппа не зарегистрировано. На вирусы ОРВИ обследовано 46 больных ГПЗ/ОРИ, случаев ГПЗ/ОРИ не выявлено. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 46 больных ГПЗ/ОРИ, выявлен 1 (2,2%) случай новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Убедительно просим расширить работу по ПЦР-детекции вирусов гриппа в клинических материалах.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Референс-центр по гриппу при ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева" Минздрава России по электронной почте: darria.danilenko@influenza.spb.ru, nadezda.konvalova@influenza.spb.ru


Эпидемиологические данные

Рис. 1. Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2024/25 и 2025/26 гг.




На 46 неделе 2025 г. уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ повысился, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 54,0 на 10 000 населения, был ниже базовой линии (82,9) на 34,9% и ниже еженедельного эпидемического порога на 19,8%.

Рис. 2. Сравнение заболеваемости «гриппом» по данным клинической диагностики в сезоны 2024/25 и 2025/26 гг.



На 46 неделе 2025 г. частота клинически диагностированного гриппа повысилась, составила 0,36 на 10 000 населения, и была ниже предэпидемической базовой линии (0,45).

Рис. 3. Показатель госпитализации больных с клиническим диагнозом «грипп» в сезоны 2024/25 и 2025/26 гг.



На 46 неделе 2025 г. частота госпитализации с диагнозом "грипп" повысилась, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 0,077 на 10 000 населения, была ниже предэпидемической базовой линии (0,099).

Результаты лабораторной диагностики

Лабораторными методами (ПЦР) на 46 неделе 2025 года при исследовании материалов от 10084 больных гриппом в 46 городах зарегистрировано 683 (6,8%) случая гриппа, в том числе 290 (2,9%) случаев несубтипированного гриппа А в 10 городах, 13 (0,1%) случаев гриппа А(Н1N1)pdm09 в 2 городах, 374 (3,7%) случая гриппа А(Н3N2) в 29 городах и 6 (0,06%) случаев гриппа В в 6 городах.

На 46 неделе на клеточной культуре MDCK выделено 3 вируса гриппа А(Н3N2), том числе: в Москве (ЦЭЭГ) (1), Москве (ФГУЗ) (1) и Новосибирске (1). Всего с начала сезона 2025-2026 в опорных базах и НЦГ было изолировано 6 вирусов гриппа А(Н3N2).

Антигенная характеристика. В НЦГ Москвы (ЦЭЭГ) и Санкт-Петербурга (НИИ гриппа) антигенно охарактеризовано 7 вирусов гриппа, в том числе: 1 вирус гриппа А(Н1N1)pdm09 и 6 вирусов гриппа А(Н3N2). Вирус А(Н1N1)pdm09 был родствен референс штамму A/Victoria/4897/22, рекомендованному в состав вакцин для стран Северного полушария на сезон 2025-2026 гг.. 5 вирусов А(Н3N2) были дрейф-вариантом референс штамма A/Croatia/10136RV/23, также рекомендованному в состав вакцин для стран Северного полушария на сезон 2025-2026 гг., 1 вирус А(Н3N2) был подобен референс штамму A/Thailand/8/2022.

Рис. 4. Результаты лабораторной диагностики гриппа в базовых лабораториях двух НЦГ ВОЗ в РФ




Рис. 5. Мониторинг гриппа по результатам ПЦР диагностики в базовых лабораториях двух Национальных центров по гриппу ВОЗ в РФ, сезон 2025/26гг.





Рис. 6. Мониторинг ОРВИ негриппозной этиологии по результатам ПЦР диагностики в базовых лабораториях двух Национальных центров по гриппу ВОЗ в РФ, сезон 2025/26гг.



ОРВИ. Частота диагностирования ОРВИ негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция) составила по результатам ПЦР **15,3%**, по результатам ИФА (парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекция) **17,8%**.

Рис. 7. Мониторинг гриппа по результатам выделения вирусов гриппа в базовых лабораториях двух Национальных центров по гриппу ВОЗ в РФ, сезон 2025/26гг.





Таблица 1. Результаты ПЦР диагностики в базовых лабораториях двух НЦГ ВОЗ в РФ за 46 неделю 2025г.

	Число образцов / число положительных	% положит.
Грипп		
Число образцов тестированных на грипп	10084	-
Грипп А (не субт.)	290	2,9%
Грипп А(Н1)рdm09	13	0,1%
Грипп А(Н3)	374	3,7%
Грипп В	6	0,06%
Весь грипп	683	6,8%
Другие ОРВИ		
Число образцов тестированных на другие ОРВИ	9956	-
Парагрипп	222	2,2%
Аденовирус	131	1,3%
РС-вирус	54	0,5%
Риновирус	766	7,7%
Коронавирус	96	1,0%
Метапневмовирус	108	1,1%
Бокавирус	149	1,5%
Все ОРВИ	1526	15,3%
SARS-CoV-2 (COVID-19)		
Число образцов тестированных на SARS-CoV-2	13506	-
SARS-CoV-2	323	2,4%

Рис. 8. Результаты ПЦР-детекции SARS-CoV-2 в базовых лабораториях двух НЦГ ВОЗ в РФ



COVID-19. Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 с 12 недели 2025 года. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Согласно поступившей информации в базу данных НИИ гриппа, на 46 неделе, в системе надзора за гриппом и ОРВИ, по результатам ПЦР анализа клинических материалов от 13506 больных, новый коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен в 323 (2,4%) случаях.

Таблица 2. Результаты выделения вирусов гриппа в базовых лабораториях двух НЦГ ВОЗ в РФ за 46 неделю 2025г.

	Число образцов / число вирусов	% выделен. вирусов
Число образцов	17	-
Грипп А(Н1)рdm09	0	0,0%
Грипп А(Н3)	3	17,6%
Грипп В	0	0,0%
Весь грипп	3	17,6%

Сигнальный надзор

В системе Сигнального надзора на прошедшей неделе на грипп обследовано 19 больных ТОРИ в 3 городах (Калининград, Новосибирск, Чита), случаев гриппа не выявлено.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 17 больных ТОРИ в 2 городах, выявлено 4 (26,7%) случая новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в Чите у ребёнка возрастной группы 1-4 года (1) и у больных возрастной группы 65 лет и старше (3).

На вирусы ОРВИ обследовано 17 больных ТОРИ, зарегистрировано 5 (29,4%) случаев ОРВИ, в том числе: 1 случай аденовирусной и 4 - риновирусной инфекции.

При обследовании 46 амбулаторных больных ГПЗ/ОРИ случаев гриппа не зарегистрировано. На вирусы ОРВИ обследовано 46 больных ГПЗ/ОРИ, случаев ГПЗ/ОРИ не выявлено. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 46 больных ГПЗ/ОРИ, выявлен 1 (2,2%) случай новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Рис. 9. Результаты мониторинга гриппа при ТОРИ в городах – базах Сигнального надзора, сезон 2025/26гг.




Рис. 10. Результаты мониторинга гриппа при ГПЗ/ОРИ в городах – базах Сигнального надзора, сезон 2025/26гг.




Рис. 11. Результаты мониторинга ОРВИ при ТОРИ в городах – базах Сигнального надзора, сезон 2025/26гг.





Рис. 12. Результаты мониторинга ОРВИ при ГПЗ/ОРИ в городах – базах Сигнального надзора, сезон 2025/26гг.



Примечание:

Сводка по ситуации в России составлена на основе данных 51 опорной базы ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России и 10 опорных баз ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России

Ситуация в зарубежных странах

Информация по гриппу была опубликована на сайте WHO (Update от 12.11.2025 № 551), за период 03.11-09.11.2025 на сайте FluNet и на сайте Европы (ERVISS), за период 02.11-08.11.2025 на сайте США (FluView) и на сайте Канады (FluWatch).

По данным ВОЗ от 26.10.2025 с 31.12.2019 г. в мире ВОЗ официально подтверждено 778 885 759 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у людей, в том числе 7 103 253 (0,9% от числа заболевших) случая со смертельным исходом.

Северное полушарие.

Европа. По данным ERVISS за период с 03 по 09 ноября 2025 года уровень активности вирусов гриппа повысился и в 3 странах (Грузия, Болгария, Казахстан) превысил базовую линию. Из 35 стран в 10 зарегистрирована эпидемия гриппа.

В целом, в системе Сигнального надзора за 45 неделью 2025 года выявлено 317 случаев гриппа из них в 100% случаев выявлен грипп А. У больных ТОРИ выявлено 84 случая гриппа из них в 100% случаев выявлен грипп А.

Недозорными источниками диагностировано 134 случая гриппа A(H1N1)pdm09, 652 - гриппа A(H3N2), 4821 - несубтипированного гриппа А и 72 - гриппа типа В.

С начала сезона 2025-2026 генетически охарактеризовано 199 вирусов гриппа, из них 55 штаммов A(H1N1)pdm09, 141 штамм A(H3N2) и 3 вируса гриппа В.

Из 55 вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 2 вируса принадлежали клайду 6B.1A.5a.2a и были подобны референс-штамму A/Hungary/286/2024(H1N1)pdm09, 53 - клайду 6B.1A.5a.2a.1, из них 16 были подобны референс-штамму A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09 и 37 были подобны референс-штамму A/Missouri/11/2025(H1N1)pdm09.

Из 141 вируса гриппа A(H3N2) 98 штаммов принадлежали клайду 3C.2a1b.2a.2a.3a.1, из них 57 были подобны вакцинному вирусу A/Croatia/10136RV/2023, 1 штамм референс-вирусу AH3/Netherlands/10685/2024, 1 штамм референс-вирусу A/Lisboa/216/2023, 1 штамм - референс-вирусу A/Singapore/GP20238/2024 и 38 штаммов - референс-вирусу A/Norway/8765/2025.

Из 3 вирусов гриппа В все вирусы принадлежали клайду V1A.3a.2, из них 1 был подобен вакцинному штамму B/Austria/1359417/2021 и 2 вируса - референс-штамму B/Catalonia/2279261NS/2023.

США. По данным CDC на 45 неделе 2025 года активность вирусов гриппа была низкой. Лабораторными методами выявлено 72 (17,3%) случая гриппа, в том числе 15 случаев гриппа A(H1N1)pdm09, 38 - A(H3N2) и 14 - несубтипированного гриппа А.

С начала сезона 2025-2026 не зарегистрировано ни одного случая смерти ребёнка от гриппа.

С 18.05.2025 CDC генетически охарактеризовано 514 вирусов гриппа, в том числе 273 штамма A(H1N1)pdm09, 124 штамма A(H3N2) и 117 штаммов гриппа В Викторианской линии. Из 273 штаммов A(H1N1)pdm09 6 вирусов принадлежали клайду 6B.1A.5a.2a и 267 - клайду 6B.1A.5a.2a.1. Из 124 штаммов A(H3N2) все вирусы принадлежали клайду 3C.2a1b.2a.2a.3a.1. Из 117 штаммов гриппа В все вирусы принадлежали клайду V1A.3a.2.

Канада. По данным FluWatch на 45 неделе 2025 года активность вирусов гриппа повысилась. 24 региона и 8 провинций Канады сообщили о спорадической активности гриппа, 6 регионов и 2 провинции - о локальной активности. Лабораторными методами выявлено 754 случая гриппа, из них в 734 случаях грипп А и в 20 случаях грипп В.

С 01.09.2025 Национальной микробиологической лабораторией Канады антигенно охарактеризовано 64 вируса гриппа, в том числе 36 штаммов A(H1N1)pdm09, 26 штаммов A(H3N2) и 2 штамма гриппа В.

Из 36 штаммов A(H1N1)pdm09 все были подобны вакцинному штамму A/Wisconsin/67/2022 A(H1N1)pdm09.

Из 26 штаммов A(H3N2) 6 были сходны с вакцинным штаммом A/District of Columbia/27/2023 (H3N2), при использовании антисывороток, полученных к вирусу A/District of Columbia/27/2023 (H3N2), 20 вирусов показали сниженный титр с антисыворотками, полученными против A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)-подобного вируса.

Оба вируса гриппа типа В были подобны вакцинному штамму B/Austria/1359417/2021.

С 01.09.2025 Национальной микробиологической лабораторией Канады генетически охарактеризовано 54 вируса гриппа, в том числе 27 штаммов A(H1N1)pdm09, 24 штамма A(H3N2) и 3 штамма гриппа В Викторианской линии.

Все 27 штаммов A(H1N1)pdm09 принадлежали клайду 6B.1A.5a.2a.1.

Все 24 штамма A(H3N2) принадлежали клайду 3C.2a1b.2a.2a.3a.1.

Все 3 штамма гриппа В принадлежали клайду V1A.3a.2.

Азия. В Катаре и Сингапуре зарегистрированы локальные вспышки гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В.